

Хүүхдийн нүдний өвчин Хэзээ? Юу хийх вэ?

А.Буяндэлгэр

Хүүхдийн харааны хэвийн хөгжил

- Дөнгөж төрсөн нярай хүүхэд
- Зөвхөн гэрэл ба сүүдэр ялгана- гэрэл мэдэрнэ;
- Хүүхэн хараа гэрлийн урвалтай;
- Үе үе хялар харж болно.
- 1 сар
- 30см зайнд харна;
- Гэрэл рүү хааяа нэг тогтож харна;
- Заримдаа хялар харж болно.

2-3 сар

- 80 см хүртэл зайнд харна;
- Юмны урт өргөнийг харна;
- Хар цагаан зураас ба цагираг ялгаж харж эхэлнэ;
- Өнгө ялгаж эхэлнэ: эхлээд улаан;
- Тоглоом руу удаан тогтож харж эхэлнэ;
- Хөдөлж байгаа тоглоомыг дагуулж харах гэж оролдоно;
- Хос хараа үүсэж эхэлнэ;
- Хааяа нэг хялар харж болно.

4-6 сар

- Ойрын зайнд харж эхэлнэ;
- Юмны урт, өргөн, гүнийг харж эхэлнэ;
- Янз бүрийн өнгө ялгаж харж эхэлнэ;
- Тоглоом руу тогтож харж эхэлнэ, хөдөлж байгаа юмсыг дагуулж харна;
- Эцэг эхээ танина, өөрийгөө толинд харна;
- 6 сартай хос хараа бүрэлдэж тогтоно.

7-12 сар

- 7-8 метр хүртэл харна;
- Харааны чадал сайжирч жижигхэн зүйлсийг ялгаж харж чаддаг болно;
- Орон зайн баримжаатай болно;
- Зай тодорхойлж чаддаг болно;
- Харсан зүйл рүүгээ гараа явуулна, барьж явна, явж очно;
- хялар харахаа болино.
-

Төрөлхийн катаракт

- 10 мянган төрөлтөнд 3-6 тохиолдоно.
- Нэг нүднийх бол анестезиолог эмч зөвшөөрөнгүүт мэс засал хийнэ. 1 хоногтой ч хийнэ.
- Хоёр нүднийх бол 6 долоо хоногтой хийнэ. 2сарын дотор мэс засал хийхгүй бол Stimulus deprivation amblyopia үүсэж фиксацийн нистагмтай болдог
- 6 сартайгаас оройтвол шар толбо хөгждөггүй.

Төрөлхийн глауком

- 10 мянгад нэг тохиолддог
- Хугацаа алдахгүй эмчилвэл 80-90% нь бүр мөсөн эдгэрдэг.

Нулимс-хамрын сувагны бөглөрөл

- Хэвийн төрсөн хүүхдүүдийн 5%д тохиолдоно
- 1 нас хүртэл массаж хийнэ
- Үрэвсвэл яаралтай сэтгүүрдэнэ
- Эцэг эх нь оюуны хомсдолтой бол шууд сэтгүүрдэнэ

Нярайн конъюнктивит

- Гонококкын салстын идээт үрэвсэл
- Стафилококкын салстын идээт үрэвсэл: Бохир гар, багажнаас халдварладаг

Хүүхдийн аденовирусийн КОНЬЮНКТИВИТ

- Нууц үе 8 хоног
- 2-4 хоногийн дотор нөгөө нүдэндээ шилжинэ
- Маш амархан 2догчоор бактерийн, харшлын хүндрэлүүд гардаг.
- 6 хоногоос зовиур нь багасч эхэлдэг.
- Стеройдын бэлдмэлийг 10 хоногоос хэрэглэхийг зөвлөдөг.
- Хиймэл нулимас

НЭВТ ГЭМТЭЛ

- Эпители өмнөд камер луу ургах
- Факогенный увеит
- Судаслагийн ховхрол

Зөрүү хараа-страбисмус

- Хүүхдийн 2%д тохиолддог.
- Хялар - ХТ
- Долир - ЕТ
- Сөлөр - НТ
- Төрөлхийн зөрүү хараатай үед шаардлагатай бол 6 сартай мэс засал хийнэ.
- ХТ ийн үед 4настай мэс засал хийнэ.
- Зөрүү харааны өнцөгийг заавал зөв шил дор хаяж 2сар зүүлгэж байгаад хол, ойрд хэмжиж мэс заслыг нэг нүдэнд хийх үү хоёр нүдэнд хийх үү гэдгийг шийднэ.
- Мэс заслын зорилго бол ортофори биш.

Зөрүү хараатай хүүхдийн рефракц

- Бүх төрлийн зөрүү хараатай хүүхдэд тулгаж шил өгнө
- Атропин, гоматропин, циклопентолат хэрэглэнэ
- Амблиопын эмчилгээг тохирсон шил 2 сар зүүлгэсний дараа эхэлнэ.
- Хаалт эмчилгээг цэцэрлэг, хичээл тарсны дараа гэртээ 2-6 хийхэд хангалттай.

Төрөлхийн энтропион

- Эпиблефарон
- 1 нас хүртэл нь ажиглана

Дутуу наярйн ретинопати

- < 32 долоо хоног
- Биеийн жин < 1500гр, ялангуяа < 1250гр.
- Үр хөврөлийн 40 долоо хоногт хүүхэн харааг өргөсгөж склер депресс хийж торлог шалгана.
- Фенилэфрин 1.0% + циклопентолат 0.2% дусааж өргөсгөнө.